



Patient Information

Cardiac (viability) FDG PET



Web site link for more information on this procedure:
Scan QR code (print version)
Touch QR code (PDF version)



SUPER SAHYOG
Nuclear Imaging



પ્રક્રિયા પહેલાં પ્રક્રિયા સે પહેલે Before procedure

આહાર Food	<ul style="list-style-type: none"> ✗ ખાલી પેટ (6 કલાક) ✗ ખાલી પેટ (6 ઘંટે) ✗ Fasting (6 hours)
પાણી Water	અડધું લિટર સાદું પાણી પ્રક્રિયાનાં એક કલાક પહેલાં આધા લીટર સાદા પાણી પ્રક્રિયા કે એક ઘંટે પૂર્વ Half litre water 1 hour before procedure
પેશાબ કરી શકાએ છે? પેશાબ કર સકતે હોય? Can pass urine?	✓
સગભર્ણ સ્ત્રીઓ ગર્ભવતી મહિલાએં Pregnant ladies	<ul style="list-style-type: none"> ✗ પ્રક્રિયા પ્રતિબંધિત છે ✗ પ્રક્રિયા પ્રતિબંધિત હૈ ✗ Procedure is prohibited
સ્તનપાન સ્તનપાન Breastfeeding	નિર્દેશ માટે Super SahaYog સ્ટાફનો સંપર્ક કરો નિર્દેશ કે લિએ Super SahaYog સ્ટાફ સે સંપર્ક કરોં Contact Super SahaYog staff for directions
દવાઓ દવાઈ Drugs	<ul style="list-style-type: none"> ✗ ડાયાબિટીસની ગોળીઓ અને ઇન્સ્યુલિન (6 કલાક) ✗ ડાઇબીટીજ કી ગોલિયાં ઔર ઇન્સુલિન (6 ઘંટે) ✗ Diabetes tablets and insulin (6 hours)

પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયા કે દૌરાન During procedure

ડૉક્ટરની લેખિત સલાહ ડૉક્ટર કી લિખિત સલાહ Doctor's written advice	ફરજિયાત અનિવાર્ય Compulsory
પાલક સાથે આવવાનું પાલક કે સાથ આના Accompanying carer	ફરજિયાત અનિવાર્ય Compulsory
પ્રક્રિયા માટેનો સમયગાળો પ્રક્રિયા કી અવધિ Time for procedure	સામાન્યત: 5 કલાક. મહત્તમ: 7 કલાક સામાન્યત: 5 ઘંટે અધિકતમ 7 ઘંટે Typical: 5 hours. Maximum: 7 hours

પ્રક્રિયા પછી પ્રક્રિયા કે બાદ After procedure

સાવચેતી સાવધાની Precaution	સગભર્ણ સ્ત્રીઓ અને બાળકોથી અંતર ગર્ભવતી મહિલાઓં ઔર બચ્ચોં સે દૂરી Distance from pregnant ladies and children
રિપોર્ટ માટેનો સમય રિપોર્ટ કો સમય Time for report	સામાન્યત: 12 કલાક. મહત્તમ: 24 કલાક સામાન્યત: 12 ઘંટે અધિકતમ 24 ઘંટે Typical: 12 hours. Maximum: 24 hours
વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને આગળ વાંચો અધિક જાનકારી કે લિએ કૃપયા આગે પઢોં Please read ahead for further details	



પ્રક્રિયાના 1 દિવસ પહેલા

કૂપા કરીને Super Sahyog સ્ટાફને અપોઇન્ટમેન્ટ ના પૂર્વ જાણ કરો જો: (1) દર્દી 20 મિનિટ માટે સ્થિર સૂઈ ન શકે, (2) શ્વાસ લેવામાં તકલીફ હાએ, અથવા (3) પ્રક્રિયાની અવધિ માટે વિશેષ તબીબી ધ્યાનની જરૂર હોએ.

સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટે પ્રક્રિયા પ્રતિબંધિત છે.

જો દર્દી સાધ્યપણે સ્તનપાન કરાવતા હોય, તો પ્રક્રિયા પહેલા માતાનું દૂધ કાઢો, તેને રેફિજરેટરમાં ફીઝ કરો અને બીજા કોઈ વ્યક્તિને (દર્દી સિવાય) તેને આગામી 12 કલાક સુધી બાળકને એજ (નવશોકું) દૂધ પીવડાવવાનું રહેશે.

પ્રક્રિયા ના દિવસ

પ્રક્રિયા શરૂ કરવા માટે ડૉક્ટરની સલાહનો પુરાવો જરૂરી છે.

દર્દી જવાબદાર પાલક સાથે હોવા જોઈએ.

કૂપા કરીને ઓછામાં ઓછું $\frac{1}{2}$ લિટર સાંદું પાણી પ્રક્રિયાનાં 1 કલાક પહેલા પીવો.

ઢીલા ફિટિંગવાળા પણ ગરમ વસ્ત્રો પહેરશો. મૌંધા અને મેટાલિક જીવેલરી અથવા એસેસરીઝ લાવશો નહિં.

તમારા તમામ પ્રાસંગિક તબીબી રેકોર્ડ્સ લાવો (દા.ત., ડૉક્ટરોની નોંધો, બ્લડ રિપોર્ટ્સ, સારવારની વિગતો, ECG, angiography / angioplasty રિપોર્ટ્સ, વગેરે).

પ્રક્રિયાના મુખ્ય ચરણો [કુલ: 5 - 7 કલાક]: (1) નોંધણી, IV કેન્યુલા (30 મિનિટ). (2) 25 - 50 gram glucose વાળું પાણી પીવાનું અને insulin નું ઈન્જેક્શન (30 મિનિટ). (3) લોહીમાં glucoseનું સ્તર સંતોષકારક થઈ જાય પછી FDGનું ઈન્જેક્શન (2 કલાક). (4) શરીરમાં FDGનું વિતરણ (60 - 90 મિનિટ). (5) સ્કેનર ટેબલ પર (20 મિનિટ). (6) સ્કેનની ઝડપી સમીક્ષા પછી રજા (30 મિનિટ).

પ્રક્રિયા પછી

6 કલાક માટે સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને 10 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોથી ઓછામાં ઓછું 1 મીટરનું અંતર જાળવો. અન્ય પુખ્ત વયના વ્યક્તિનો સાથે નિકટતા સલામત છે.

દિવસભર પુષ્ટ પાણી પીવો.

લેખિત રિપોર્ટ અને છબીઓ સાથે જારી કરાયેલ DVD/USB ડ્રાઇવને ભવિષ્યમાં સરખામણી માટે સાચવી રાખવાં. કૂપા કરીને ખાતરી કરો કે DVD પર કોઈ જાતના ઉજરડા ના પડે અથવા કોઈ પ્રકારનું નુકસાન ન થાએ.

અગવડતા/જોખમો: (1) IV કેન્યુલા દાખલ કરતા સમયે અને ઈન્જેક્શન દરમિયાન પીડા અથવા નસ ફાંટવાનું જોખમ. (2) glucoseને કારણો ઉબકા આવવાં (3) insulinને કારણો ધબરામણ, ચક્કર આવવાં.

રિપોર્ટ માટેનો સમય: (1) સામાન્યત: 12 કલાક. (2) મહત્તમ: 24 કલાક.



प्रक्रिया से 1 दिन पहले

कृपया अपॉइंटमेंट के समय Super Sahyog स्टाफ को बताएं यदि: (1) 20 मिनट तक स्थिर लेटने में कठिनाई हो, (2) सांस लेने में कठिनाई हो, या (3) प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर के उपस्थिति की आवश्यकता हो। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रक्रिया प्रतिबंधित है।

यदि दर्दी सक्रिय रूप से स्तनपान करा रही हैं, तो प्रक्रिया से पहले माता का दूध निकालें, उसे रेफ्रिजरेटर में जमा दें, और अगले 12 घंटों के लिए किसी और व्यक्ति (दर्दी के अलावा) को बच्चे को वह (गुनगुना) दूध पिलाना होगा।

प्रक्रिया के दिन

प्रक्रिया शुरू करने के लिए डॉक्टर की सलाह का प्रमाण आवश्यक है। दर्दी जिम्मेदार पालक के साथ होने चाहिए।

कृपया प्रक्रिया से 1 घंटे पहले कम से कम $\frac{1}{2}$ लीटर सादा पानी पियें। ढीले-ढाले लेकिन गर्म कपड़े पहनें। महंगे और धातु के आभूषण न लाएं।

अपने सभी प्रासंगिक मेडिकल रिपोर्ट (जैसे, डॉक्टरों के नोट्स, रक्त रिपोर्ट, उपचार विवरण, ECG, angiography / angioplasty रिपोर्ट, आदि) साथ लाएं।

प्रक्रिया के मुख्य चरण [कुल: 5 - 7 घंटे]: (1) पंजीकरण, IV कैनुला (30 मिनट)। (2) 25 - 50 gram glucose वाला पनि और insulin इन्जेक्शन (30 मिनट)। (3) रक्त में glucose का संतोषजनक स्तर पहुँचने पर FDG इन्जेक्शन (2 घंटे)। (4) शरीर में FDG का वितरण (60 - 90 मिनट)। (5) स्कैनर टेबल पर (20 मिनट)। (6) स्कैन की सतही समीक्षा और छुट्टी (30 मिनट)।

प्रक्रिया के बाद

6 घंटे तक गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अन्य वयस्कों के साथ निकट संपर्क सुरक्षित है।

दिन भर में भरपूर पानी पिएं।

लिखित रिपोर्ट और छवियों के साथ जारी की गई DVD/USB को भविष्य में तुलना के लिए सुरक्षित रखें। कृपया सुनिश्चित करें कि DVD पर खरोंच न आए अथवा किसी अन्य तरीके से क्षतिग्रस्त न हो।

असुविधा/जोखिम: (1) IV कैनुला डालने और इंजेक्शन के दौरान दर्द या अत्यधिक रक्तस्त्राव। (2) glucose के कारण उबकाई। (3) insulin के कारण घबराहट, चक्कर आना।

रिपोर्ट के लिए समय: (1) सामान्यतः 12 घंटे। (1) अधिकतम 24 घंटे।



1 day before procedure

Please inform the Super Sahyog staff at the time of appointment if: (1) the patient is unable to lie still for 20 min, (2) has breathing difficulty, or (3) might need special medical attention during procedure.

Procedure is prohibited for pregnant ladies

If patient is actively breastfeeding, then extract breast milk, freeze it in a refrigerator, and for next 12 hours, someone else (other than the mother) must feed the same (lukewarm) milk to the baby.

On the day of procedure

Proof of doctor's request is necessary for starting the procedure.

The patient must be with a responsible carer.

Have at least ½ litre of plain water 1 hour before the procedure.

Wear loose-fitting but warm clothes. Do not bring expensive and metallic jewellery or accessories.

Bring all your relevant medical records (e.g., doctors' notes, blood reports, reports, treatment details, ECG, angiography / angioplasty reports, etc.).

Procedure's major steps [total: 5 - 7 hours]: (1) Registration, IV cannula (30 min). (2) 25 - 50 gram oral glucose followed by insulin injection. (3) FDG injection once satisfactory blood glucose level is reached (2 hours). (4) FDG distribution within the body (60 - 90 min). (5) On scanner table (20 min). (6) Quick survey of scan and discharge (30 min).

After procedure

For 6 hours, maintain at least 1 metre-distance from pregnant ladies and children younger than 10 years' age. Close contact with other adults is safe.

Drink plenty of water throughout the day.

Preserve the DVD / USB drive issued with the text report and images for future comparison. Please ensure that the DVD does not get scratched or damaged in any other manner.

Discomfort / risks: (1) Pain and/or extravasation during IV cannula insertion and injections. (2) Possible nausea while having glucose. (3) Insulin can cause anxiety, giddiness, etc.

Time for report: (1) Typically: 12 hours. (2) Maximum: 24 hours.

Why choose us?



F expertise quipment ase



PET-CT



SPECT



Therapy

📍 G1 & G2, Canal Point,
Near INS Hospital,
Khatodara, Surat - 395002.

📞 +91 92271-02468, +91 92271-12468

📅 +91 261-2990921.

✉️ scan@supersahyog.com

🌐 www.supersahyog.com



Location
(scan/touch)



Save contact

Scan (print version)
Touch (PDF version)