



Patient Information

F-DOPA brain PET



Web site link for more information on this procedure:

Scan QR code (print version)

Touch QR code (PDF version)



SUPER SAHYOG
Nuclear Imaging

પ્રક્રિયા પહેલાં પ્રક્રિયા સે પહેલે Before procedure

આહાર આહાર Food	× ખાલી પેટ (4 કલાક) × खाली पेट (4 घंटे) × Fasting (4 hours)
પાણી પાણી Water	અડધું લિટર સાદું પાણી પ્રક્રિયાનાં એક કલાક પહેલાં आधा लीटर सादा पानी प्रक्रिया के एक घंटे पूर्व Half litre water 1 hour before procedure
પેશાબ કરી શકાએ છે ? पेशाब कर सकते हैं? Can pass urine?	✓
સગર્ભા સ્ત્રીઓ गर्भवती महिलाएं Pregnant ladies	× પ્રક્રિયા પ્રતિબંધિત છે × प्रक्रिया प्रतिबंधित है × Procedure is prohibited
સ્તનપાન स्तनपान Breastfeeding	નિર્દેશ માટે Super Sahyog સ્ટાફનો સંપર્ક કરો निर्देश के लिए Super Sahyog स्टाफ से संपर्क करें Contact Super Sahyog staff for directions
દવાઓ दवाई Drugs	× Levodopa (12 કલાક) × Levodopa (12 घंटे) × Levodopa (12 hours)

પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયા કે દૌરાન During procedure

ડોક્ટરની લેખિત સલાહ डॉक्टर की लिखित सलाह Doctor's written advice	ફરજિયાત अनिवार्य Compulsory
પાલક સાથે આવવાનું पालक के साथ आना Accompanying carer	ફરજિયાત अनिवार्य Compulsory
પ્રક્રિયા માટેનો સમયગાળો प्रक्रिया की अवधि Time for procedure	સામાન્યતઃ 5 કલાક. મહત્તમ : 6.5 કલાક सामान्यतः 5 घंटे। अधिकतम 6.5 घंटे Typical: 5 hours. Maximum: 6.5 hours

પ્રક્રિયા પછી પ્રક્રિયા કે બાદ After procedure

સાવચેતી सावधानी Precaution	સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને બાળકોથી અંતર गर्भवती महिलाओं और बच्चों से दूरी Distance from pregnant ladies and children
રિપોર્ટ માટેનો સમય रिपोर्ट को समय Time for report	સામાન્યતઃ 12 કલાક. મહત્તમ : 24 કલાક सामान्यतः 12 घंटे। अधिकतम 24 घंटे Typical: 12 hours. Maximum: 24 hours

વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને આગળ વાંચો
अधिक जानकारी के लिए कृपया आगे पढ़ें
Please read ahead for further details

પ્રક્રિયાના 1 દિવસ પહેલા

કૃપા કરીને Super Sahyog સ્ટાફને અપોઇન્ટમેન્ટ ના પૂર્વ જાણ કરો જો : (1) દર્દી 20 મિનિટ માટે સ્થિર સૂઈ ન શકે, (2) શ્વાસ લેવામાં તકલીફ હાએ, અથવા (3) પ્રક્રિયાની અવધિ માટે વિશેષ તબીબી ધ્યાનની જરૂર હોએ.

સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટે પ્રક્રિયા પ્રતિબંધિત છે.

જો દર્દી સક્રિયપણે સ્તનપાન કરાવતા હોય, તો પ્રક્રિયા પહેલા માતાનું દૂધ કાઢો, તેને રેફ્રિજરેટરમાં ફીઝ કરો અને બીજા કોઈ વ્યક્તિએ (દર્દી સિવાય) તેને આગામી 12 કલાક સુધી બાળકને એજ (નવશેકું) દૂધ પીવડાવવાનું રહેશે.

પ્રક્રિયા ના દિવસ

પ્રક્રિયા શરૂ કરવા માટે ડૉક્ટરની સલાહનો પુરાવો જરૂરી છે.

દર્દી જવાબદાર પાલક સાથે હોવા જોઈએ.

કૃપા કરીને ઓછામાં ઓછું ½ લિટર સાદું પાણી પ્રક્રિયાનાં 1 કલાક પહેલા પીવો. ઢીલા ફિટિંગવાળા પણ ગરમ વસ્ત્રો પહેરશો. મોંઘા અને મેટાલિક જૂવેલરી અથવા એસેસરીઝ લાવશો નહિં.

તમારા તમામ પ્રાસંગિક તબીબી રેકૉર્ડ્સ લાવો (દા.ત., ડૉક્ટરોની નોંધો, બ્લડ રિપોર્ટ્સ, અન્ય CT, MRI અથવા PET-CT સ્કેનના રિપોર્ટ્સ અને છબીઓ / CD / DVD / pen drive, સારવારની વિગતો, વગેરે).

પ્રક્રિયાના મુખ્ય ચરણો [કુલ : 5 - 6.5 કલાક] : (1) Carbidopa ગોળી (60 - 90 મિનિટ). (2) નોંધણી, IV કેન્યુલા, RP ઈન્જેક્શન (30 મિનિટ). (3) શરીરમાં RPનું વિતરણ (60 - 90 મિનિટ). (4) સ્કેનર ટેબલ પર (20 મિનિટ). (5) સ્કેનની ઝડપી સમીક્ષા પછી રજા (30 મિનિટ).

પ્રક્રિયા પછી

6 કલાક માટે સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને 10 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોથી ઓછામાં ઓછું 1 મીટરનું અંતર જાળવો. અન્ય પુખ્ત વયના વ્યક્તિઓ સાથે નિકટતા સલામત છે.

દિવસભર પુષ્કળ પાણી પીવો.

લેખિત રિપોર્ટ અને છબીઓ સાથે જારી કરાયેલ DVD/USB ડ્રાઇવને ભવિષ્યમાં સરખામણી માટે સાચવી રાખવાં. કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે DVD પર કોઈ જાતના ઉઝરડા ના પડે અથવા કોઈ પ્રકારનું નુકસાન ન થાએ.

અગવડતા/જોખમો : (1) IV કેન્યુલા દાખલ કરતા સમયે અને ઈન્જેક્શન દરમિયાન પીડા અથવા નસ ફાંટવાનું જોખમ. (2) બીજું કંઈ ઉલ્લેખનીય નહીં.

રિપોર્ટ માટેનો સમય : (1) સામાન્યતઃ 12 કલાક. (2) મહત્તમ : 24 કલાક.

प्रक्रिया से 1 दिन पहले

कृपया अपॉइंटमेंट के समय Super Sahyog स्टाफ को बताएं यदि: (1) 20 मिनट तक स्थिर लेटने में कठिनाई हो, (2) सांस लेने में कठिनाई हो, या (3) प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर के उपस्थिति की आवश्यकता हो।

गर्भवती महिलाओं के लिए प्रक्रिया प्रतिबंधित है।

यदि दर्दी सक्रिय रूप से स्तनपान करा रही हैं, तो प्रक्रिया से पहले माता का दूध निकालें, उसे रेफ्रिजरेटर में जमा दें, और अगले 12 घंटों के लिए किसी और व्यक्ति (दर्दी के अलावा) को बच्चे को वह (गुनगुना) दूध पिलाना होगा।

प्रक्रिया के दिन

प्रक्रिया शुरू करने के लिए डॉक्टर की सलाह का प्रमाण आवश्यक है। दर्दी जिम्मेदार पालक के साथ होने चाहिए।

कृपया प्रक्रिया से 1 घंटे पहले कम से कम 1/2 लीटर सादा पानी पियें। ढीले-ढाले लेकिन गर्म कपड़े पहनें। महंगे और धातु के आभूषण न लाएं।

अपने सभी प्रासंगिक मेडिकल रिकॉर्ड (जैसे, डॉक्टरों के नोट्स, रक्त रिपोर्ट, अन्य CT, MRI या PET-CT स्कैन की रिपोर्ट / छवियां / CD / DVD / pen drive, उपचार विवरण, आदि) साथ लाएं।

प्रक्रिया के मुख्य चरण [कुल: 5 - 6.5 घंटे]: (1) Carbidopa गोली (60 - 90 मिनट)। (2) पंजीकरण, IV कैनुला, RP इंजेक्शन (30 मिनट)। (3) शरीर में RP का वितरण (60 - 90 मिनट)। (4) स्कैनर टेबल पर (20 मिनट)। (5) स्कैन की सतही समीक्षा और छुट्टी (30 मिनट)।

प्रक्रिया के बाद

6 घंटे तक गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अन्य वयस्कों के साथ निकट संपर्क सुरक्षित है।

दिन भर में भरपूर पानी पिएं।

लिखित रिपोर्ट और छवियों के साथ जारी की गई DVD/USB को भविष्य में तुलना के लिए सुरक्षित रखें। कृपया सुनिश्चित करें कि DVD पर खरोंच न आए अथवा किसी अन्य तरीके से क्षतिग्रस्त न हो।

असुविधा/जोखिम: (1) IV कैनुला डालने और इंजेक्शन के दौरान दर्द या अत्यधिक रक्तस्राव। (2) और कुछ उल्लेखनीय नहीं।

रिपोर्ट के लिए समय: (1) सामान्यतः 12 घंटे। (1) अधिकतम 24 घंटे।



1 day before procedure

Please inform the Super Sahyog staff at the time of appointment if: (1) the patient is unable to lie still for 20 min, (2) has breathing difficulty, or (3) might need special medical attention during procedure.

Procedure is prohibited for pregnant ladies

If patient is actively breastfeeding, then extract breast milk, freeze it in a refrigerator, and for next 12 hours, someone else (other than the mother) must feed the same (lukewarm) milk to the baby.

On the day of procedure

Proof of doctor's request is necessary for starting the procedure.

The patient must be with a responsible carer.

Have at least ½ litre of plain water 1 hour before the procedure.

Wear loose-fitting but warm clothes. Do not bring expensive and metallic jewellery or accessories.

Bring all your relevant medical records (e.g., doctors' notes, blood reports, reports and images / CD / DVD / pen drive of other CT, MRI or PET-CT scans, treatment details, etc.).

Procedure's major steps [total: 5 - 6.5 hours]: (1) Carbidopa tablet (60 - 90 min). (2) Registration, IV cannula, RP injection (30 min). (3) RP distribution within body (60 - 90 min). (4) On scanner table (20 min). (5) Quick survey of scan and discharge (30 min).

After procedure

For 6 hours, maintain at least 1 metre-distance from pregnant ladies and children younger than 10 years' age. Close contact with other adults is safe.

Drink plenty of water throughout the day.

Preserve the DVD / USB drive issued with the text report and images for future comparison. Please ensure that the DVD does not get scratched or damaged in any other manner.

Discomfort / risks: (1) Pain and/or extravasation during IV cannula insertion and injections. (2) Nothing else remarkable.

Time for report: (1) Typically: 12 hours. (2) Maximum: 24 hours.

Why choose us?



Expertise
Equipment
Ease



PET-CT



SPECT



Therapy

📍 G1 & G2, Canal Point,
Near INS Hospital,
Khatodara, Surat - 395002.
☎ +91 92271-02468, +91 92271-12468
📞 +91 261-2990921.
✉ scan@supersahyog.com
🌐 www.supersahyog.com



Location
(scan/touch)



Save contact

Scan (print version)
Touch (PDF version)



SUPER SAHYOG
Nuclear Imaging