



Patient Information

HIDA hepatobiliary scan



Web site link for more information on this procedure:

Scan QR code (print version)

Touch QR code (PDF version)



SUPER SAHYOG
Nuclear Imaging

પ્રક્રિયા પહેલાં પ્રક્રિયા સે પહેલે Before procedure

આહાર આહાર Food	✗ ખાલી પેટ (પુખ્ત વય : 6 કલાક. શિશુ : 2 કલાક.) ✗ खाली पेट (वयस्क: 6 घंटे। शिशु: 2 घंटे।) ✗ Fasting (Adult: 6 hours. Infant: 2 hours.)
પાણી પાણી Water	1/2 લિટર સાદું પાણી પ્રક્રિયાનાં 1 કલાક પહેલાં (પુખ્ત વય) 1/2 લીટર સાદા પાણી પ્રક્રિયા કે 1 ઘંટે પૂર્વે (વયસ્ક) 1/2 litre water 1 hour before procedure (adult)
પેશાબ કરી શકાએ છે ? પેશાબ કર સકતે હૈં? Can pass urine?	✓
સગર્ભા સ્ત્રીઓ ગર્ભવતી મહિલાएं Pregnant ladies	✗ પ્રક્રિયા પ્રતિબંધિત છે ✗ પ્રક્રિયા પ્રતિબંધિત હૈ ✗ Procedure is prohibited
સ્તનપાન સ્તનપાન Breastfeeding	નિર્દેશ માટે Super Sahyog સ્ટાફનો સંપર્ક કરો निर्देश के लिए Super Sahyog स्टाफ से संपर्क करें Contact Super Sahyog staff for directions
દવાઓ દવાઈ Drugs	બધી લઈ શકાય છે सारी ली जा सकती हैं All can be taken

પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયા કે દૌરાન During procedure

ડોક્ટરની લેખિત સલાહ डॉक्टर की लिखित सलाह Doctor's written advice	ફરજિયાત अनिवार्य Compulsory
પાલક સાથે આવવાનું पालक के साथ आना Accompanying carer	ફરજિયાત अनिवार्य Compulsory
પ્રક્રિયા માટેનો સમયગાળો प्रक्रिया की अवधि Time for procedure	દિવસ 1 : 5 - 6 કલાક ; દિવસ 2 : 1 કલાક दिन 1: 5 - 6 घंटे। दिन 2: 1 घंटा Day 1: 5 - 6 hours. Day 2: 1 hour.

પ્રક્રિયા પછી પ્રક્રિયા કે બાદ After procedure

સાવચેતી सावधानी Precaution	સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને બાળકોથી અંતર गर्भवती महिलाओं और बच्चों से दूरी Distance from pregnant ladies and children
રિપોર્ટ માટેનો સમય रिपोर्ट को समय Time for report	સામાન્યતઃ 12 કલાક. મહત્તમ : 24 કલાક सामान्यत: 12 घंटे। अधिकतम 24 घंटे Typical: 12 hours. Maximum: 24 hours

વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને આગળ વાંચો
 अधिक जानकारी के लिए कृपया आगे पढ़ें
 Please read ahead for further details

પ્રક્રિયાના પહેલા

પૂર્વ એપોઇન્ટમેન્ટ જરૂરી છે.

કૃપા કરીને Super Sahyog સ્ટાફને અપોઇન્ટમેન્ટ ના પૂર્વ જાણ કરો જો: (1) દર્દી 30 મિનિટ માટે સ્થિર સૂઈ ન શકે, (2) શ્વાસ લેવામાં તકલીફ હાએ, અથવા (3) પ્રક્રિયાની અવધિ માટે વિશેષ તબીબી ધ્યાનની જરૂર હોએ.

સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટે પ્રક્રિયા પ્રતિબંધિત છે.

જો દર્દી સક્રિયપણે સ્તનપાન કરાવતા હોય, તો પ્રક્રિયા પહેલા માતાનું દૂધ કાઢો, તેને રેફ્રિજરેટરમાં ફ્રીઝ કરો અને બીજા કોઈ વ્યક્તિએ (દર્દી સિવાય) તેને આગામી 12 કલાક સુધી બાળકને એજ (નવશેકું) દૂધ પીવડાવવાનું રહેશે.

પ્રક્રિયા ના દિવસ

પ્રક્રિયા શરૂ કરવા માટે ડૉક્ટરની સલાહનો પુરાવો જરૂરી છે.

દર્દી જવાબદાર પાલક સાથે હોવા જોઈએ.

પુખ્ત વયના દર્દીઓએ 6 કલાકથી વધુ ભૂખ્યા ન રહેવું.

કૃપા કરીને ઓછામાં ઓછું 1/2 લિટર સાદું પાણી પ્રક્રિયાનાં 1 કલાક પહેલા પીવો (ફક્ત વયસ્કોને લાગુ). શિશુને (<1 વર્ષની ઉંમર) જરૂરિયાત અનુસાર થોડું પાણી આપો.

ઢીલા ફિટિંગવાળા પણ ગરમ વસ્ત્રો પહેરશો. મોંઘા અને મેટાલિક જૂવેલરી અથવા એસેસરીઝ લાવશો નહિં.

તમારા તમામ પ્રાસંગિક તબીબી રેકૉર્ડ્સ લાવો (દા.ત., ડૉક્ટરોની નોંધો, બ્લડ રિપોર્ટ્સ, CT/USG સ્કેનના રિપોર્ટ્સ અને છબીઓ / CD / DVD / pen drive, સારવારની વિગતો, વગેરે).

પ્રક્રિયાના મુખ્ય ચરણો [દિવસ 1; 5 - 6 કલાક]: (1.1) નોંધણી, IV કેન્યુલા (30 મિનિટ). (1.2) સ્કેનની શરૂઆતમાં સ્કેનર ટેબલ પર mebrofenin ઈન્જેક્શન (પ્રારંભિક સ્કેન: 30 મિનિટ). (1.3) 5 - 10 મિનિટ સુધી ચાલતા સ્કેન 5 - 6 વાર કુલ 5 કલાક સુધી લેવામાં આવે છે. [દિવસ 2; 1 કલાક]: (2.1) 10 મિનિટ નો એક સ્કેન.

પ્રક્રિયા પછી

6 કલાક માટે સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને 10 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોથી ઓછામાં ઓછું 1 મીટરનું અંતર જાળવો. અન્ય પુખ્ત વયના વ્યક્તિઓ સાથે નિકટતા સલામત છે.

દિવસભર પુષ્કળ પાણી પીવો.

જારી કરાયેલ લેખિત રિપોર્ટ અને અસલ (original) છબીઓ ભવિષ્યમાં સરખામણી માટે સાચવી રાખવાં.

અગવડતા/જોખમો: (1) IV કેન્યુલા દાખલ કરતા સમયે અને ઈન્જેક્શન દરમિયાન પીડા અથવા નસ ફાંટવાનું જોખમ. (2) બીજું કંઈ ઉલ્લેખનીય નહીં.

રિપોર્ટ માટેનો સમય: (1) સામાન્યતઃ 12 કલાક. (2) મહત્તમ: 24 કલાક.

प्रक्रिया से पहले

पूर्व अपॉइंटमेंट अनिवार्य है।

कृपया अपॉइंटमेंट के समय Super Sahyog स्टाफ को बताएं यदि: (1) 30 मिनट तक स्थिर लेटने में कठिनाई हो, (2) सांस लेने में कठिनाई हो, या (3) प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर के उपस्थिति की आवश्यकता हो।

गर्भवती महिलाओं के लिए प्रक्रिया प्रतिबंधित है।

यदि दर्दी सक्रिय रूप से स्तनपान करा रही हैं, तो प्रक्रिया से पहले माता का दूध निकालें, उसे रेफ्रिजरेटर में जमा दें, और अगले 12 घंटों के लिए किसी और व्यक्ति (दर्दी के अलावा) को बच्चे को वह (गुनगुना) दूध पिलाना होगा।

प्रक्रिया के दिन

प्रक्रिया शुरू करने के लिए डॉक्टर की सलाह का प्रमाण आवश्यक है।

दर्दी जिम्मेदार पालक के साथ होने चाहिए।

वयस्कों को 6 घंटों से अधिक भूखा नहीं रहना है।

कृपया प्रक्रिया से 1 घंटे पहले कम से कम 1/2 लीटर सादा पानी पियें (केवल वयस्कों को लागू)। शिशु (<1 वर्ष आयु) को आवश्यकता के अनुसार थोड़ा पानी पिलाएं।

ढीले-ढाले लेकिन गर्म कपड़े पहनें। महंगे और धातु के आभूषण न लाएं।

अपने सभी प्रासंगिक मेडिकल रिकॉर्ड (जैसे, डॉक्टरों के नोट्स, रक्त रिपोर्ट, CT / USG स्कैन की रिपोर्ट / छवियां / CD / DVD / pen drive , उपचार विवरण, आदि) साथ लाएं।

प्रक्रिया के मुख्य चरण [दिन 1; 5 - 6 घंटे]: (1.1) पंजीकरण, IV कैनुला (30 मिनट)। (1.2) स्कैन की शुरुआत में स्कैनर टेबल पर mebrofenin इन्जेक्शन (प्रारम्भिक स्कैन: 30 मिनट)। (1.3) 5 - 10 मिनट चलने वाले स्कैन 5 - 6 बार कुल 5 घंटों तक लिए जाते हैं। [दिन 2; 1 घंटा]: (2.1) 10 मिनट का एक स्कैन।

प्रक्रिया के बाद

6 घंटे तक गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अन्य वयस्कों के साथ निकट संपर्क सुरक्षित है।

दिन भर में भरपूर पानी पिएं।

जारी किए गए लिखित रिपोर्ट और मूल (original) छवियों को भविष्य में तुलना के लिए सुरक्षित रखें।

असुविधा/जोखिम: (1) IV कैनुला डालने और इन्जेक्शन के दौरान दर्द या अत्यधिक रक्तस्राव। (2) और कुछ उल्लेखनीय नहीं।

रिपोर्ट के लिए समय: (1) सामान्यतः 12 घंटे। (1) अधिकतम 24 घंटे।



Before procedure

Prior appointment is compulsory.

Please inform the Super Sahyog staff at the time of appointment if: (1) the patient is unable to lie still for 30 min, (2) has breathing difficulty, or (3) might need special medical attention during procedure.

Procedure is prohibited for pregnant ladies

If patient is actively breastfeeding, then extract breast milk, freeze it in a refrigerator, and for next 12 hours, someone else (other than the mother) must feed the same (lukewarm) milk to the baby.

On the day of procedure

Proof of doctor's request is necessary for starting the procedure.

The patient must be with a responsible carer.

Adults must not go hungry for longer than 6 hours.

Please have at least 1/2 litre of plain water 1 hour before the procedure (applicable only to adults). Infants (<1 year age) may be given some water to drink as per need.

Wear loose-fitting but warm clothes. Do not bring expensive and metallic jewellery or accessories.

Bring all your relevant medical records (e.g., doctors' notes, blood reports, reports and images / CD / DVD / pen drive of CT / USG scans, treatment details, etc.).

Procedure's major steps [Day 1; total: 5 - 6 hours]: (1.1) Registration, IV cannula (30 min). (1.2) Mebrofenin injection at the start of scan on the scanner table (initial scan: 30 min). (1.3) A total of 5 - 6 scans of 5 - 10 min each over next 5 hours. [Day 2; total: 1 hour]: (2.1) Single scan lasting 10 min.

After procedure

For 6 hours, maintain at least 1 metre-distance from pregnant ladies and children younger than 10 years' age. Close contact with other adults is safe.

Drink plenty of water throughout the day.

Preserve the issued text report and original images for future comparison.

Discomfort / risks: (1) Pain and/or extravasation during IV cannula insertion and injections. (2) Nothing else remarkable.

Time for report: (1) Typically: 12 hours. (2) Maximum: 24 hours.

Why choose us?



Expertise
Equipment
Ease



PET-CT



SPECT



Therapy

📍 G1 & G2, Canal Point,
Near INS Hospital,
Khatodara, Surat - 395002.
☎ +91 92271-02468, +91 92271-12468
📞 +91 261-2990921.
✉ scan@supersahyog.com
🌐 www.supersahyog.com



Location
(scan/touch)



Save contact

Scan (print version)
Touch (PDF version)



SUPER SAHYOG
Nuclear Imaging